

معلومات للمرضى وقدمي الرعاية

ما تحتاج أن تعرفه عن الإلتهابات وجروح
العمليات

تاريخ النشر: ٢٤ فبراير ٢٠٢١
تاريخ المراجعة النهائية: ٢٤ فبراير ٢٠٢٣



الالتهابات وجروح العمليات الجراحية
جروح العملية الجراحية هو قطع للجلد أثناء القيام بإجراء جراحي بواسطة مشرط جراحي أو أي أداة أخرى.

يمكن لجروح العمليات الجراحية أن تكون:
• نظيفة (غير ملوثة).
• ملوثة.
• مصابة بالعدوى.

التهابات جروح العمليات الجراحية غالباً ما تظهر بعد القيام بإجراء جراحي إذا ما أصيب مكان الجرح بتلوث أو عدوى.

يمكن أن يكون مصدر العدوى موجوداً قبل القيام بالجراحة داخل الجسم (عدوى مُسبقة).

يمكن لمصادر العدوى الخارجية مثل أدوات الجراحة أو ملابس الجراح أو غرفه الجراحة أن تحتوي على ميكروبات العدوى. يعتبر هذا النوع من العدوى نادر الحدوث وذلك لأن جميع الأطباء داخل المستشفى يتبعون تعليمات وأساليب صارمة لمنع حدوث عدوى مُسبقة في العمليات الجراحية.

مثال على الميكروبات المُسببة للعدوى يتضمن:
• المكورات العنقودية.
• المكورات العنقودية سلبية.
• الكوأجيولاز.
• الأشريكية القولونية.

منأشهر أنواع الفطريات المُسببة للعدوى:
• المُبيضات.
• الطوقيات البوغية.

يمكن أن يحتوي الجرح الواحد على أكثر من نوع من تلك الميكروبات المُعدية.

علامات الإصابة والأعراض

أعراض العدوى لجروح العمليات الجراحية تعتمد على درجة الإصابة وحدّة الالتهاب.

غالباً ما يصاحب التهابات جروح العمليات الجراحية الخفيفة أعراض موضعية في مكان الجرح مثل:

- احمرار في مكان الجرح.
- تورم خفيف.
- سخونة مكان الجرح.
- ترقق مكان الجرح.
- ألم خفيف.

لا يلتئم الجرح الملوث بصورة طبيعية ويمكن أن يصاحب ذلك بعض الأفرزات صفراء اللون ذات رائحة كريهة وتسمى بالصديد (القيح).

عادة ما يصاحب الالتهابات الأكثر شدة بعض الاعراض الحسدية مثل:

- الحمى.
- زيادة معدل ضربات القلب أو معدل التنفس.
- الشعور بالإجهاد ونقص الحياة.
- الشعور بالغثيان أو التقيّع.

بعض الالتهابات الخطيرة قد تتطلب الإقامة في المستشفى.



لا تقم بملامسة الجرح في خلال ٤٨ ساعة بعد القيام بالجراحة.

إذا ما استدعي الأمر ذلك، سيقوم أحد افراد العناية الطبية بغسل الجرح بغسول مُطهر دافئ خلال ٢٤ إلى ٤٨ ساعة بعد القيام بالجراحة.

تطور تلك الالتهابات وتغلغلها داخل الانسجة الداخلية للجسم قد يسبب بعض المضاعفات ويمكن أن تصبح خطراً على حياة المصاب.

تزامن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل داء السكر قد يزيد من فرص حدوث عدوى لجروح العمليات الجراحية. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

ماذا يجب أن تفعل لمنع حدوث عدوى بعد القيام بإجراء جراحي

من الممكن تقليل مخاطر الإصابة بعد عدوى بعد القيام بإجراء جراحي من خلال اتباع بعض التعليمات البسيطة.

تأكد من الحصول على القدر الكافي من الطاقة وشرب المياه:
• ظهور حمى أو أي أعراض أخرى للعدوى الشاملة.

- علامات تطور العدوى: ألم، احمرار أو زيادة التورم.
- استمرار الشعور بالألم وظهور افرزات من الجرح كالصديد أو سائل أو تكون فشرة.
- استمرار الالتهاب أو زيادة انتشاره على الرغم من تناول الدواء لعلاجه.
- إذا لاحظت أي من العلامات أعلاه، تحدث مع طبيبك على الفور!

تأكد منبقاء جسمك نظيفاً:
• قم بالاستحمام باستخدام الصابون في اليوم السابق وكذلك في نفس يوم العملية الجراحية.

- سُيُّرِّكِ طبيبك إذا ما كنت تحتاج إلى استخدام غسول مُطهر (مثل الكلوروهيكسيدين) بالإضافة إلى الصابون.
- لا تقوم بإزالة الشعر من مكان الجراحة.
- سيقوم فريق الجراحة بذلك إذا ما كان مطلوباً.

قد تحتاج إلى استخدام كريم المويروسين الأنفي وذلك للقضاء على الميكروبات داخل الأنف.
• قم بارتداء الملابس الطبية المخصصة والتي ستعطي لك قبل القيام بالجراحة.

أنقِ جسمك دافئاً:
• أحضر معك بعض الملابس الإضافية من المنزل لتبقى دافئاً قبل الجراحة.

- قم بطلب بطانية أو غطاء من الفريق الطبي إذا كنت تشعر بالبرد.

احرص دائمًا على العناية بمكان الجرح:
• تأكد دائمًا من نظافة الجرح وتغطيته.

قد يقوم طبيبك بدراسة اعراض الإصابة ونتائج التحاليل المخبرية مع اخصائي عدوى، طبيب جلدية، طبيب أمراض

تنويه هام:
يجب أن توصف المضادات الحيوية عن طريق الطبيب المختص.

إن تناول المضادات الحيوية أو إعطائها إلى طفلك من تلقاء نفسك يمكن أن يكون أمراً خطيراً.



يمكن أن تقوم بتنظيف مكان الجراحة بالماء العادي بعد القيام بالجراحة بفترة ٤٨ ساعة.
تجنب القيام بتنظيف الجرح بكثرة.

طرق العلاج

يمكن علاج معظم التهابات جروح العمليات الجراحية عن طريق المضادات الحيوية.

إن الهدف من العلاج هو التخلص من العدوى الموجودة وكذلك لمنع حدوث أنواع أخرى من العدوى في نفس الوقت لمنطقة الجرح.



علاج مضادات البكتيريا

إذا أصيب مكان الجرح بعد عدوى بعد الجراحة، سيقوم طبيبك بالبدء فوراً في علاج الجرح بالمضادات الحيوية ذات المجال الطيفي الواسع. قد يتم تغيير الدواء المستعمل في وقت لاحق بعد ظهور نتيجة المزرعة البكتيرية للجرح.

تعتمد فترة العلاج بصورة كبيرة على نوع الميكروب المناسب للعدوى وكذلك على حدة الأعراض المصاحبة. قد تستغرق فترة العلاج إلى ثلاثة أسابيع.

قم بتناول الأدوية وفقاً لتعليمات الطبيب.

تحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من حساسية للمضادات الحيوية أو الأدوية الأخرى.

معلومات إضافية

يمكن الحصول على معلومات إضافية عن علاج العدوى الجراحي ضمن المبادئ الإرشادية السريرية الوطنية المنشورة من قبل وزارة الصحة العامة القطرية.

هذا الدليل متاح لعامة الناس من خلال الرابط التالي لموقع وزارة الصحة العامة: www.moph.gov.qa